

二種混合予防接種説明書

(ジフテリア・破傷風の2種類のワクチンが含まれています)

※転入者の方へ

奄美市では小学校6年生に予診票をお送りしています。前居住地にて既に二種混合予防接種をお済みの方は、対象外となりますので母子手帳を確認の上、接種日を最寄りの支所へお伝えください。誤って2回接種することにより、副反応が強く現れることがあります。また、2回目の接種費用は全額自己負担となります。

接種期間は・・・

11歳～13歳の誕生日の前日まで

(※13歳の誕生日の前日までであれば中学1年生も接種できます。)

※医療機関ごとに接種できる日が決められています。(医療機関によっては別の日に接種できることがあります。) 詳細は裏面の医療機関一覧表をご確認ください。

副反応は・・・

注射部位の発赤・腫れ・しこりができることがあります。免疫がついたために起こる現象です。しこりは次第に小さくなりますが、数ヶ月残ることがあります。気持ちが悪くなったり、痛みがひどい場合や腫れが目立つ時は医師にご相談ください。



ジフテリアとは・・・

せきやくしゃみ等でジフテリア菌が飛び散って感染します。

感染すると高熱・のどの痛み・犬が吠える様なせき・嘔吐などが起こります。のどの腫れのため、まれに窒息死することもあります。心筋炎を発症することがあり大変危険です。

感染しても90%は何の症状もなく保菌者となりその人を通じて感染することもあります。

破傷風とは・・・

日本中のどこでも感染する恐れがあり、処置が遅れると命に関わることがあります。土の中に潜んでいる破傷風菌が、傷口から体内に入り感染します。自分で気づかない程度の軽い傷が原因でおこることもあります。けいれんや口が開かないなどの症状があります。

他の人から感染することはなく、予防接種でのみ免疫をもつことができます。

