

二種混合

予診票の色: **きみどり**

(ジフテリア・破傷風の2種類のワクチンが含まれています)

※転入者の方へ

奄美市では小学校6年生に予診票をお送りしています。前居住地にて既に二種混合予防接種をお済みの方は、対象外となります。

対象: **11歳～13歳の誕生日前日まで**

(13歳の誕生日の前日までであれば中学1年生も接種できます。)

●医療機関によっては、接種日が指定されています。詳細は裏面の医療機関一覧表をご確認ください。

副反応は・・・

注射部位の発赤・腫れ・しこりができることがあります。免疫がついたために起こる現象です。しこりは次第に小さくなりますが、数ヶ月残ることがあります。気分が悪くなったり、痛みがひどい場合や腫れが目立つ時際には、医師にご相談ください。



ジフテリアとは・・・

せきやくしゃみ等でジフテリア菌が飛び散って感染します。感染すると高熱・のどの痛み・犬が吠える様なせき・嘔吐などが起こります。のどの腫れのため、まれに窒息死することもあります。心筋炎を発症することがあり大変危険です。感染しても90%は何の症状もなく保菌者となりその人を通じて感染することもあります。

破傷風とは・・・

日本中のどこでも感染する恐れがあり、処置が遅れると命に関わる可能性があります。土の中に潜んでいる破傷風菌が、傷口から体内に入り感染します。自分で気づかない程度の軽い傷が原因でおこることもあります。けいれんや口が開かないなどの症状があります。他の人から感染することはなく、予防接種でのみ免疫をもつことができます。

